

BAROMETRE GAY 2002

A. Michel, A. Velter, C. Semaille (InVS)

Contexte

**Enquêtes comportementales en France
concernant les homosexuels masculins**

- **Enquête Presse gay : 1985 - 2000
dans la presse identitaire**
- **Baromètre Gay : 1ère édition en 2000 à Paris
dans les lieux de rencontre**

Méthodologie

- **Partenariat : SNEG, AIDES, InVS**
- **Questionnaire auto-administré ciblant les pratiques sexuelles et de prévention vis-à-vis du VIH et des IST**



Méthodologie

Distribution du questionnaire :

- à partir de juillet 2002 ; collecte sur 10 mois
- 91 lieux extérieurs de drague (AIDES)
- ensemble des établissements commerciaux affiliés au SNEG (bars, saunas, backrooms) par présentoirs, et passage d'enquêteurs à Paris
- 2 sites internet

Retour des questionnaires

Nombre de questionnaires

distribués 61 115

collectés 8 963




taux de retour 15%

Sexe : 183 femmes
8 719 hommes

Caractéristiques des 8719 hommes

- Age moyen 34.7 ans
- Domicile : 2/3 en province
- Catégories socioprofessionnelles



Champ : hommes ayant répondu aux questions


Identité sexuelle et homophobie

- 83% s'autodéfinissent comme homosexuels
- 25% ont été l'objet d'injures ou d'agressions physiques en raison de leur orientation sexuelle

Champ : hommes ayant répondu aux questions

Activité sexuelle

Nombre de partenaires dans les 12 derniers mois



Champ : hommes ayant répondu à la question

Dépistage VIH

- 89% ont eu au moins un test VIH
 - - 11% ne sont pas testés (moins de 25 ans : 24%)
 - 14% ne sont plus certains d'être encore séronégatifs
- > 25% ne savent pas où ils sont par rapport au VIH

Infection à VIH et IST

- 12% se déclarent séropositifs,
et 25 % l'ont découvert dans l'année
- 8% ont eu une gonococcie ou une syphilis
dans les 12 derniers mois

Champ : répondants ayant répondu à la question

Avec le partenaire stable

- 61% ont (eu) une relation stable
- 83% ont aussi des partenaires occasionnels
- 59% ont pratiqué au moins une fois la pénétration anale non protégée dans les 12 derniers mois

| Classe d'âge | Au moins une pénétration anale non protégée |
|--------------|---------------------------------------------|
| - 25 ans | 68% |
| 25-34 ans | 63% |
| 35-44 ans | 54% |
| 45 et + | 48% |

Champ : répondants déclarant avoir un partenaire stable

Avec les partenaires occasionnels

- 87% ont eu au moins un partenaire occasionnel

La pénétration anale :

- 92% la pratiquent
- 35% déclarent au moins une pénétration anale non protégée

Champ : répondants déclarant avoir au moins un partenaire occasionnel

Avec les partenaires occasionnels

Avoir au moins une pénétration

anale non protégée

oui

non

Moins de 25 ans

44%

56%

Plus de 25 ans

34%

66%

Cadres

28%

72%

Professions intermédiaires

34%

66%

Employés - Ouvriers

41%

59%

Champ : répondants déclarant avoir au moins un partenaire occasionnel et pratiquer la pénétration anale

Avec les partenaires occasionnels

Avoir au moins une pénétration anale non protégée

| | oui | non |
|--------------------------|------------|------------|
| 1-10 partenaires | 30% | 70% |
| 11-20 partenaires | 35% | 65% |
| + 20 partenaires | 41% | 59% |
| VIH (-) | 29% | 71% |
| Jamais testés | 38% | 62% |
| VIH incertain | 48% | 52% |
| VIH (+) | 51% | 49% |

Champ : répondants déclarant avoir au moins un partenaire occasionnel et pratiqué la pénétration anale

2000 - 2002

- **En 2000,**
 - recrudescence des prises de risque et des IST parmi les gays (EPG)
 - prise de risque plus importante pour les répondants du Baromètre Gay (BG)
- **Comparaison des B.G. 2000-2002 recueillis dans les établissements parisiens du SNEG**
 - 2000 : 2026 questionnaires
 - 2002 : 2892 questionnaires



2000 - 2002

- **Caractéristiques socio-démographiques :
une population similaire (2 ans d'intervalle)**
- **Connaissance du statut sérologique :**

Avoir fait un test : 91% vs 92% NS

Testés, pas sûrs VIH- : 16% vs 18% p= 0.000

2000 - 2002

- Avoir au moins un partenaire occasionnel :
79% vs 81% p=0.02
- + de 10 partenaires : 58% vs 59% NS
+ de 20 partenaires : 35% vs 38% p=0.05
- Pénétration anale non protégée :
33% vs 37% p=0.01

Conclusion

Le dépistage vis-à-vis du VIH est un élément essentiel de prévention

- être séronégatif, c 'est aussi prendre moins de risques**
- connaître sa séropositivité, c 'est ralentir le processus de la maladie (par le traitement) et de la transmission**



Conclusion

**La proportion de pénétrations anales non protégées,
indicateur de prise de risque,
est élevée :**

- avec le partenaire stable**
- avec les partenaires occasionnels**



Conclusion

- Résultats concordants avec l'indicateur IST, et en particulier la syphilis.
- Evolution semblable dans d'autres pays
- Nécessité de continuer les campagnes de prévention identitaires, auprès des jeunes, des séropositifs...
- La « Réponse flash » diffusée dans les lieux de rencontre

Remerciements

- A. Alexandre (SNEG)
- D. Monvoisin, M. Bourrelly (AIDES)
- S. Delaunay (INPES)

Remerciements

- Les volontaires de AIDES
- Toute l'équipe du SNEG (Syndicat National des Entreprises Gaies) et son président J.F. Chassagne
- Les établissements pour l'accueil qu'ils ont réservé à l'enquête
- Les sites internet : citegay.com et gay.com
- Et tous les anonymes qui ont été si nombreux à répondre

Le baromètre

Gay

sondage
flash

sur votre sexualité
et la prévention

Comment vivez-vous votre sexualité,
la prévention du VIH et des MST ?

merci de répondre à ce questionnaire anonyme
vos réponses permettront de renforcer l'efficacité de la prévention

Le baromètre

Gay

réponse
flash

sur votre sexualité
et la prévention

9 000 personnes ont répondu à nos questions
en France métropolitaine